

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類  
(每 10 萬人口)，民國 97 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2008

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
<b>C00-C80</b>	全癌症 (總計) ALL SITES
<b>C00-C14</b>	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
<b>C00-C14<sup>4</sup></b>	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX  口腔 <sup>5</sup> ORAL CAVITY  口咽 <sup>5</sup> OROPHARYNX  下咽 <sup>5</sup> HYPOPHARYNX
<b>C00</b>	唇 (唇的皮膚 C44.0 除外) LIP (excludes skin of lip C44.0)
<b>C01-C02</b>	舌 TONGUE
<b>C03</b>	齒齦 GUM
<b>C04</b>	口底 FLOOR OF MOUTH
<b>C05-C06</b>	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH
<b>C09-C10</b>	口咽 OROPHARYNX
<b>C12-C13</b>	下咽 HYPOPHARYNX
<b>C14</b>	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
<b>C07-C08</b>	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS
<b>C11</b>	鼻咽 NASOPHARYNX
<b>C15-C26, C48</b>	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2.3. 年齡標準化發生率<sup>2</sup>係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率<sup>3</sup>係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

5. 依據 Head and Neck Surgery and Oncology, 3rd ed.分類，詳細部位分類請參考前言第 xii 頁的說明。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	
<b>79,818</b>	<b>346.48</b>	<b>247.39</b>	<b>276.46</b>	<b>45,171</b>	<b>388.52</b>	<b>282.46</b>	<b>317.26</b>	<b>34,647</b>	<b>303.64</b>	<b>214.54</b>	<b>237.80</b>	<b>C00-C80</b>
<b>7,553</b>	<b>32.79</b>	<b>24.35</b>	<b>26.34</b>	<b>6,623</b>	<b>56.97</b>	<b>43.21</b>	<b>46.66</b>	<b>930</b>	<b>8.15</b>	<b>5.94</b>	<b>6.48</b>	<b>C00-C14</b>
5,781	25.09	18.57	20.06	5,349	46.01	34.84	37.57	432	3.79	2.71	2.97	C00-C14 <sup>4</sup>
3,932	17.07	12.64	13.67	3,594	30.91	23.42	25.27	338	2.96	2.10	2.32	
1,058	4.59	3.38	3.65	980	8.43	6.35	6.84	78	0.68	0.50	0.54	
791	3.43	2.55	2.74	775	6.67	5.08	5.46	16	0.14	0.10	0.11	
200	0.87	0.64	0.69	175	1.51	1.14	1.23	25	0.22	0.15	0.17	C00
1,569	6.81	5.04	5.46	1,394	11.99	9.06	9.79	175	1.53	1.10	1.20	C01-C02
450	1.95	1.42	1.54	410	3.53	2.65	2.85	40	0.35	0.23	0.27	C03
151	0.66	0.48	0.53	141	1.21	0.91	0.99	10	0.09	0.07	0.07	C04
2,050	8.90	6.61	7.14	1,935	16.64	12.63	13.61	115	1.01	0.73	0.80	C05-C06
568	2.47	1.82	1.96	517	4.45	3.36	3.61	51	0.45	0.32	0.35	C09-C10
752	3.26	2.42	2.61	737	6.34	4.83	5.19	15	0.13	0.09	0.10	C12-C13
41	0.18	0.13	0.14	40	0.34	0.27	0.28	1	0.01	0.01	0.01	C14
214	0.93	0.72	0.77	112	0.96	0.75	0.81	102	0.89	0.69	0.74	C07-C08
1,558	6.76	5.06	5.51	1,162	9.99	7.63	8.29	396	3.47	2.54	2.77	C11
<b>30,043</b>	<b>130.41</b>	<b>91.45</b>	<b>103.12</b>	<b>19,452</b>	<b>167.31</b>	<b>121.64</b>	<b>136.29</b>	<b>10,591</b>	<b>92.82</b>	<b>62.50</b>	<b>71.15</b>	<b>C15-C26, C48</b>

NOTE :

ASR<sup>2</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR<sup>3</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類  
(每 10 萬人口)，民國 97 年 (續)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2008 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C15	食道 ESOPHAGUS
C16	胃 STOMACH
C17	小腸 SMALL INTESTINE
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C18	結腸 COLON
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS
C25	胰 PANCREAS
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM
<b>C30-C39</b>	<b>呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS</b>
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR
C32	喉 LARYNX
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG
C38.4	胸膜 PLEURA
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2.3. 年齡標準化發生率<sup>2</sup>係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率<sup>3</sup>係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	
1,989	8.63	6.27	6.82	1,849	15.90	11.92	12.90	140	1.23	0.80	0.92	C15
3,578	15.53	10.24	11.94	2,303	19.81	13.18	15.52	1,275	11.17	7.41	8.47	C16
328	1.42	0.98	1.11	198	1.70	1.19	1.36	130	1.14	0.77	0.88	C17
11,004	47.77	32.93	37.55	6,277	53.99	38.73	43.93	4,727	41.43	27.51	31.54	C18-C21
6,456	28.02	19.15	21.95	3,536	30.41	21.60	24.66	2,920	25.59	16.87	19.42	C18
4,548	19.74	13.78	15.59	2,741	23.58	17.13	19.28	1,807	15.84	10.64	12.11	C19-C21
10,565	45.86	33.23	36.82	7,401	63.66	47.81	52.57	3,164	27.73	19.16	21.57	C22
862	3.74	2.51	2.90	444	3.82	2.64	3.05	418	3.66	2.39	2.77	C23-C24
1,518	6.59	4.53	5.18	880	7.57	5.39	6.13	638	5.59	3.72	4.26	C25
142	0.62	0.59	0.59	76	0.65	0.63	0.65	66	0.58	0.54	0.53	C48
57	0.25	0.18	0.20	24	0.21	0.15	0.17	33	0.29	0.20	0.23	C26
<b>10,550</b>	<b>45.80</b>	<b>31.21</b>	<b>35.82</b>	<b>7,027</b>	<b>60.44</b>	<b>41.99</b>	<b>48.50</b>	<b>3,523</b>	<b>30.87</b>	<b>20.99</b>	<b>23.68</b>	<b>C30-C39</b>
185	0.80	0.60	0.66	132	1.14	0.89	0.96	53	0.46	0.32	0.36	C30-C31
575	2.50	1.73	1.95	544	4.68	3.35	3.76	31	0.27	0.18	0.21	C32
9,516	41.31	27.93	32.21	6,194	53.28	36.66	42.60	3,322	29.11	19.71	22.29	C33-C34
39	0.17	0.13	0.14	32	0.28	0.21	0.23	7	0.06	0.04	0.05	C38.4
235	1.02	0.81	0.86	125	1.08	0.88	0.94	110	0.96	0.73	0.78	C37-C38.3, C38.8

NOTE :

ASR<sup>2</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR<sup>3</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 97 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2008 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
<b>C42</b>	<b>造血系統及網狀內皮系統（白血病除外）</b> <b>HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)</b>
<b>C42<sup>6</sup></b>	<b>白血病</b> <b>LEUKEMIA</b>
<b>C40-C41</b>	<b>骨、關節及關節軟骨</b> <b>BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE</b>
<b>C47, C49</b>	<b>結締組織、軟組織及其他皮下組織</b> <b>CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES</b>
<b>C44</b>	<b>皮膚</b> <b>SKIN</b>
<b>C44<sup>7</sup></b>	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA
<b>C44</b>	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)
<b>C50</b>	<b>女性乳房</b> <b>FEMALE BREAST</b>
<b>C50</b>	<b>男性乳房</b> <b>MALE BREAST</b>
<b>C51-C58</b>	<b>女性生殖器官</b> <b>FEMALE GENITAL ORGANS</b>
<b>C55</b>	子宮，未明示部位 UTERUS, NOS
<b>C53</b>	子宮頸 CERVIX UTERI
<b>C54</b>	子宮體 CORPUS UTERI
<b>C56, C57.0-C57.4</b>	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT
<b>C51-C52, C57.7-C57.9</b>	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS
<b>C60-C63</b>	<b>男性生殖器官</b> <b>MALE GENITAL ORGANS</b>

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2.3. 年齡標準化發生率<sup>2</sup>係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率<sup>3</sup>係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

6. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

7. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44，M-87203 - M-87903。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	
416	1.81	1.26	1.43	247	2.12	1.47	1.70	169	1.48	1.05	1.16	C42
1,645	7.14	6.18	6.48	940	8.09	6.99	7.38	705	6.18	5.38	5.58	C42 <sup>6</sup>
164	0.71	0.66	0.69	90	0.77	0.73	0.76	74	0.65	0.59	0.61	C40-C41
429	1.86	1.58	1.66	253	2.18	1.85	1.95	176	1.54	1.32	1.38	C47, C49
2,585	11.22	7.33	8.63	1,380	11.87	7.99	9.38	1,205	10.56	6.68	7.89	C44
188	0.82	0.56	0.64	102	0.88	0.56	0.68	86	0.75	0.56	0.60	C44 <sup>7</sup>
2,397	10.40	6.77	7.99	1,278	10.99	7.42	8.71	1,119	9.81	6.13	7.29	C44
8,136	71.30	51.95	56.07	-	-	-	-	8,136	71.30	51.95	56.07	C50
35	0.30	0.22	0.25	35	0.30	0.22	0.25	-	-	-	-	C50
4,430	38.82	27.96	30.48	-	-	-	-	4,430	38.82	27.96	30.48	C51-C58
6	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	6	0.05	0.04	0.04	C55
1,725	15.12	10.71	11.78	-	-	-	-	1,725	15.12	10.71	11.78	C53
1,424	12.48	9.02	9.75	-	-	-	-	1,424	12.48	9.02	9.75	C54
1,110	9.73	7.18	7.79	-	-	-	-	1,110	9.73	7.18	7.79	C56, C57.0-C57.4
165	1.45	1.00	1.12	-	-	-	-	165	1.45	1.00	1.12	C51-C52, C57.7-C57.9
3,878	33.36	22.55	26.76	3,878	33.36	22.55	26.76	-	-	-	-	C60-C63

NOTE :

ASR<sup>2</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR<sup>3</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類  
(每 10 萬人口)，民國 97 年 (續完)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2008 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND
C62	睪丸 TESTIS
C60,C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS
<b>C64-C68</b>	<b>泌尿器官 URINARY TRACT</b>
C67	膀胱 BLADDER
C64	腎 KIDNEY
C65	腎盂 RENAL PELVIS
C66	輸尿管 URETER
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS
C68.9	泌尿系統，未明示部位 URINARY SYSTEM, NOS
<b>C69</b>	<b>眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND</b>
<b>C70-C72</b>	<b>中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM</b>
C71	腦 BRAIN
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM
<b>C73</b>	<b>甲狀腺 THYROID GLAND</b>
<b>C74-C75</b>	<b>其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS</b>

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2.3. 年齡標準化發生率<sup>2</sup>係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率<sup>3</sup>係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	
3,603	30.99	20.46	24.55	3,603	30.99	20.46	24.55	-	-	-	-	C61
178	1.53	1.51	1.54	178	1.53	1.51	1.54	-	-	-	-	C62
97	0.83	0.59	0.67	97	0.83	0.59	0.67	-	-	-	-	C60,C63
<b>4,186</b>	<b>18.17</b>	<b>12.49</b>	<b>14.29</b>	<b>2,626</b>	<b>22.59</b>	<b>16.11</b>	<b>18.33</b>	<b>1,560</b>	<b>13.67</b>	<b>9.06</b>	<b>10.43</b>	<b>C64-C68</b>
2,040	8.86	5.94	6.88	1,476	12.70	8.93	10.25	564	4.94	3.13	3.69	C67
887	3.85	2.80	3.11	607	5.22	3.82	4.27	280	2.45	1.82	1.97	C64
643	2.79	1.94	2.21	300	2.58	1.90	2.13	343	3.01	1.97	2.28	C65
393	1.71	1.13	1.33	144	1.24	0.88	1.01	249	2.18	1.38	1.65	C66
18	0.08	0.05	0.06	8	0.07	0.05	0.06	10	0.09	0.06	0.07	C68.0-C68.1
12	0.05	0.04	0.04	6	0.05	0.04	0.05	6	0.05	0.04	0.04	C68.8
193	0.84	0.58	0.66	85	0.73	0.49	0.57	108	0.95	0.67	0.74	C68.9
<b>51</b>	<b>0.22</b>	<b>0.25</b>	<b>0.23</b>	<b>36</b>	<b>0.31</b>	<b>0.35</b>	<b>0.33</b>	<b>15</b>	<b>0.13</b>	<b>0.15</b>	<b>0.14</b>	<b>C69</b>
<b>675</b>	<b>2.93</b>	<b>2.66</b>	<b>2.74</b>	<b>387</b>	<b>3.33</b>	<b>3.03</b>	<b>3.12</b>	<b>288</b>	<b>2.52</b>	<b>2.29</b>	<b>2.35</b>	<b>C70-C72</b>
595	2.58	2.35	2.42	350	3.01	2.73	2.82	245	2.15	1.97	2.01	C71
80	0.35	0.31	0.32	37	0.32	0.30	0.31	43	0.38	0.32	0.34	C70, C72
<b>2,001</b>	<b>8.69</b>	<b>6.73</b>	<b>7.29</b>	<b>440</b>	<b>3.78</b>	<b>2.95</b>	<b>3.19</b>	<b>1,561</b>	<b>13.68</b>	<b>10.50</b>	<b>11.37</b>	<b>C73</b>
<b>59</b>	<b>0.26</b>	<b>0.33</b>	<b>0.29</b>	<b>30</b>	<b>0.26</b>	<b>0.37</b>	<b>0.32</b>	<b>29</b>	<b>0.25</b>	<b>0.29</b>	<b>0.27</b>	<b>C74-C75</b>

NOTE :

ASR<sup>2</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR<sup>3</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.



表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類  
(每 10 萬人口)，民國 97 年 (續完)

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2008 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
<b>C76</b>	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES
<b>C80</b>	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES  惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2.3. 年齡標準化發生率<sup>2</sup>係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率<sup>3</sup>係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	
12	0.05	0.05	0.05	4	0.03	0.02	0.03	8	0.07	0.07	0.06	C76
880	3.82	2.59	2.97	510	4.39	3.03	3.49	370	3.24	2.15	2.47	C80
2,088	9.06	6.78	7.51	1,212	10.42	7.94	8.81	876	7.68	5.65	6.23	

NOTE :

ASR<sup>2</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR<sup>3</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 97 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2008

---

## 白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

---

### 白血病

**LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)**

急性淋巴芽細胞白血病

ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)

慢性淋巴球白血病

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)

急性骨髓樣白血病

ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)

慢性骨髓樣白血病

CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)

其他類型白血病<sup>8</sup>

LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia

### 惡性淋巴瘤

**MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)**

何杰金氏淋巴瘤

HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)

非何杰金氏淋巴瘤

NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

- 
- 註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。
- 2.3. 年齡標準化發生率<sup>2</sup>係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率<sup>3</sup>係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。
8. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>
<b>1,645</b>	<b>7.14</b>	<b>6.18</b>	<b>6.48</b>	<b>940</b>	<b>8.09</b>	<b>6.99</b>	<b>7.38</b>	<b>705</b>	<b>6.18</b>	<b>5.38</b>	<b>5.58</b>
223	0.97	1.48	1.29	132	1.14	1.70	1.48	91	0.80	1.25	1.08
640	2.78	2.15	2.36	341	2.93	2.29	2.53	299	2.62	2.02	2.21
115	0.50	0.34	0.39	74	0.64	0.42	0.50	41	0.36	0.26	0.28
195	0.85	0.65	0.72	113	0.97	0.73	0.82	82	0.72	0.58	0.62
472	2.05	1.56	1.72	280	2.41	1.85	2.06	192	1.68	1.27	1.39
<b>2,088</b>	<b>9.06</b>	<b>6.78</b>	<b>7.51</b>	<b>1,212</b>	<b>10.42</b>	<b>7.94</b>	<b>8.81</b>	<b>876</b>	<b>7.68</b>	<b>5.65</b>	<b>6.23</b>
147	0.64	0.60	0.62	85	0.73	0.68	0.71	62	0.54	0.52	0.54
1,941	8.43	6.18	6.88	1,127	9.69	7.25	8.10	814	7.13	5.14	5.69

NOTE :

ASR<sup>2</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR<sup>3</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 97 年【依據 WHO 2008 年的分類編修<sup>1</sup>】

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2008

---

## 白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

---

### 白血病

#### LEUKEMIA AND MYELOID NEOPLASMS, TOTAL

#### 急性骨髓樣白血病

##### ACUTE MYELOID LEUKEMIA

復發性遺傳變異之急性骨髓樣白血病

AML with recurrent genetic abnormalities (ICD-O-3 M-98663、M-98713、M-98963、M-98973)

骨髓增生不良相關轉變之急性骨髓樣白血病

AML with myelodysplasia-related changes (ICD-O-3 M-98953)

治療相關之骨髓瘤

Therapy-related myeloid neoplasms (ICD-O-3 M-99203)

未明示急性骨髓樣白血病

Acute myeloid leukemia, NOS (ICD-O-3 M-98613)

其他急性骨髓樣白血病

Other acute myeloid leukemia (ICD-O-3 M-98403、M-98673、M-98703、M-98723、M-98733、M-98743、M-98913、M-99103、M-99313)

骨髓樣肉瘤

Myeloid sarcoma (ICD-O-3 M-99303)

芽細胞漿性樹突狀細胞瘤

Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm (ICD-O-3 M-97273)

#### 急性淋巴芽細胞白血病

##### ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

B 淋巴芽細胞白血病 / 淋巴瘤

B lymphoblastic leukemia / lymphoma (ICD-O-3 M-97283、M-98363)

T 淋巴芽細胞白血病 / 淋巴瘤

T lymphoblastic leukemia / lymphoma (ICD-O-3 M-97293、M-98373)

---

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考第 xiii 頁的說明。

2.3. 年齡標準化發生率<sup>2</sup>係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率<sup>3</sup>係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>
<b>1,694</b>	<b>7.35</b>	<b>6.37</b>	<b>6.68</b>	<b>973</b>	<b>8.37</b>	<b>7.26</b>	<b>7.67</b>	<b>721</b>	<b>6.32</b>	<b>5.48</b>	<b>5.69</b>
<b>685</b>	<b>2.97</b>	<b>2.37</b>	<b>2.57</b>	<b>368</b>	<b>3.17</b>	<b>2.57</b>	<b>2.78</b>	<b>317</b>	<b>2.78</b>	<b>2.18</b>	<b>2.36</b>
89	0.39	0.35	0.35	41	0.35	0.33	0.33	48	0.42	0.37	0.38
30	0.13	0.09	0.10	21	0.18	0.12	0.14	9	0.08	0.06	0.06
2	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	2	0.02	0.01	0.01
249	1.08	0.77	0.87	146	1.26	0.89	1.02	103	0.90	0.66	0.74
307	1.33	1.12	1.19	156	1.34	1.18	1.24	151	1.32	1.06	1.14
5	0.02	0.02	0.02	2	0.02	0.01	0.01	3	0.03	0.02	0.02
3	0.01	0.02	0.02	2	0.02	0.03	0.03	1	0.01	0.01	0.01
<b>151</b>	<b>0.66</b>	<b>1.00</b>	<b>0.87</b>	<b>93</b>	<b>0.80</b>	<b>1.19</b>	<b>1.04</b>	<b>58</b>	<b>0.51</b>	<b>0.79</b>	<b>0.68</b>
106	0.46	0.76	0.64	59	0.51	0.82	0.69	47	0.41	0.70	0.58
45	0.20	0.24	0.23	34	0.29	0.38	0.35	11	0.10	0.09	0.09

NOTE :

ASR<sup>2</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR<sup>3</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 97 年【依據WHO 2008 年的分類編修<sup>1</sup>】（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2008 (CONTINUED)

---

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

---

慢性骨髓樣白血病

CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633、M-99643)

慢性淋巴球白血病

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-96703、M-98233)

系統歧異不明之急性白血病

ACUTE LEUKEMIAS OF AMBIGUOUS LINEAGE (ICD-O-3 M-98013)

骨髓增生惡性病

MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS (ICD-O-3 M-97403、M-97413、M-97423、M-99503、M-99603、M-99613、M-99623、M-99753)

骨髓造血不良症候群

MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (ICD-O-3 M-99803、M-99823、M-99833、M-99843、M-99853、M-99863、M-99873、M-99893)

急性混合型白血病

ACUTE BIPHENOTYPIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98053)

未明示淋巴芽細胞白血病

LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA, NOS (ICD-O-3 M-98353)

其他白血病

OTHER LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98203、M-98323、M-98603)

未明示白血病

LEUKEMIA, NOS (ICD-O-3 M-98003)

---

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考第 xiii 頁的說明。

2.3. 年齡標準化發生率<sup>2</sup>係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率<sup>3</sup>係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>
197	0.86	0.66	0.73	115	0.99	0.73	0.83	82	0.72	0.58	0.62
156	0.68	0.47	0.54	95	0.82	0.55	0.65	61	0.53	0.38	0.42
32	0.14	0.08	0.10	22	0.19	0.12	0.14	10	0.09	0.05	0.06
185	0.80	0.60	0.67	103	0.89	0.67	0.75	82	0.72	0.54	0.59
157	0.68	0.46	0.54	97	0.83	0.58	0.68	60	0.53	0.35	0.40
11	0.05	0.04	0.04	4	0.03	0.02	0.03	7	0.06	0.06	0.06
102	0.44	0.63	0.56	63	0.54	0.73	0.66	39	0.34	0.53	0.46
9	0.04	0.03	0.03	7	0.06	0.04	0.05	2	0.02	0.01	0.01
9	0.04	0.04	0.04	6	0.05	0.05	0.05	3	0.03	0.03	0.02

NOTE :

ASR<sup>2</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR<sup>3</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.



表二之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 97 年【依據WHO 2008 年的分類編修<sup>1</sup>】（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2008 (CONTINUED)

## 白血病及惡性淋巴瘤

### HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

#### 惡性淋巴瘤

#### MALIGNANT LYMPHOMA

##### 何杰金氏淋巴瘤

HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503、M-96513、M-96523、M-96533、M-96593、M-96613、M-96623、M-96633、M-96643、M-96653、M-96673)

##### 非何杰金氏淋巴瘤

#### NON-HODGKIN LYMPHOMA

##### B 細胞淋巴樣瘤

#### B-cell lymphoid neoplasms

邊緣區淋巴瘤（脾、結節內、與黏膜相關淋巴樣組織）

Marginal zone lymphoma (splenic, nodal and MALT) (ICD-O-3 M-96893、M-96993)

MALT lymphoma of stomach (ICD-O-3 C16 & M-96993)

淋巴漿細胞性淋巴瘤

Lymphoplasmacytic lymphoma (ICD-O-3 M-96713、M-97613)

濾泡性淋巴瘤

Follicular lymphoma (ICD-O-3 M-96753、M-96903、M-96913、M-96953、M96983)

外套細胞淋巴瘤

Mantle cell lymphoma (ICD-O-3 M-96733)

Burkitt 氏淋巴瘤

Burkitt lymphoma (ICD-O-3 M-96873、M-98263)

瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤(任一亞型)

Diffuse large B-cell lymphoma (any subtype) (ICD-O-3 M-96803、M-96843)

原發性縱膈腔（胸腺）大 B 細胞淋巴瘤

Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma (ICD-O-3 M-96793)

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考第 xiii 頁的說明。

2.3. 年齡標準化發生率<sup>2</sup>係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率<sup>3</sup>係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>
2,458	10.67	7.86	8.74	1,431	12.31	9.17	10.26	1,027	9.00	6.59	7.26
146	0.63	0.60	0.62	84	0.72	0.68	0.70	62	0.54	0.52	0.54
2,312	10.04	7.26	8.12	1,347	11.59	8.49	9.56	965	8.46	6.07	6.72
1,381	5.99	4.30	4.82	782	6.73	4.88	5.51	599	5.25	3.75	4.16
195	0.85	0.60	0.67	88	0.76	0.52	0.60	107	0.94	0.67	0.74
66	0.29	0.19	0.22	28	0.24	0.15	0.18	38	0.33	0.23	0.26
18	0.08	0.05	0.06	14	0.12	0.07	0.09	4	0.04	0.02	0.03
174	0.76	0.55	0.61	94	0.81	0.60	0.66	80	0.70	0.51	0.55
35	0.15	0.10	0.12	28	0.24	0.17	0.19	7	0.06	0.04	0.05
47	0.20	0.21	0.21	30	0.26	0.27	0.27	17	0.15	0.15	0.15
902	3.92	2.75	3.12	521	4.48	3.19	3.64	381	3.34	2.33	2.62
6	0.03	0.03	0.03	4	0.03	0.04	0.04	2	0.02	0.02	0.02

NOTE :

ASR<sup>2</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR<sup>3</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 97 年【依據 WHO 2008 年的分類編修<sup>1</sup>】（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2008 (CONTINUED)

---

## 白血病及惡性淋巴瘤

### HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

---

其他 B 細胞淋巴瘤

Other B-cell lymphomas (ICD-O-3 M-95963、M-96783、M-98333、M-99403)

#### **T/NK 細胞淋巴瘤**

##### **T/NK-cell lymphoid neoplasms**

鼻型及其它結節外 NK/T 細胞淋巴瘤

Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal or other type (ICD-O-3 M-97193)

皮膚型 T 細胞淋巴瘤（包含蕁樣黴菌症 / Sezary 氏症候群）

Cutaneous T cell lymphoma (Including Mycosis fungoides / Sézary syndrome) (ICD-O-3 M-97003、M-97013、M-97093、M-97183)

腸病型 T 細胞淋巴瘤

Enteropathy-type T-cell lymphoma (ICD-O-3 M-97173)

肝脾 T 細胞淋巴瘤

Hepatosplenic T-cell lymphoma (ICD-O-3 M-97163)

皮下脂膜炎樣 T 細胞淋巴瘤

Subcutaneous panniculitis-like T-cell Lymphoma (ICD-O-3 M-97083)

未明示周圍性 T 細胞淋巴瘤

Peripheral T-cell lymphoma, NOS (ICD-O-3 M-97023)

血管免疫芽細胞性 T 細胞淋巴瘤

Angioimmunoblastic T-cell lymphoma (ICD-O-3 M-97053)

退行分化型大細胞淋巴瘤

Anaplastic large cell lymphoma (ICD-O-3 M-97143)

成人 T 細胞淋巴瘤 / 白血病

Adult T-cell lymphoma / leukemia (ICD-O-3 M-98273)

其他 T 細胞淋巴瘤

Other T-cell lymphomas (ICD-O-3 M-98343、M-99483)

---

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考第 xiii 頁的說明。

2.3. 年齡標準化發生率<sup>2</sup>係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率<sup>3</sup>係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>
4	0.02	0.01	0.01	3	0.03	0.02	0.02	1	0.01	0.01	0.01
336	1.46	1.09	1.21	213	1.83	1.41	1.56	123	1.08	0.78	0.87
65	0.28	0.21	0.23	46	0.40	0.30	0.34	19	0.17	0.11	0.13
54	0.23	0.18	0.20	31	0.27	0.20	0.23	23	0.20	0.16	0.17
6	0.03	0.02	0.02	5	0.04	0.03	0.03	1	0.01	0.01	0.01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0.03	0.03	0.03	4	0.03	0.03	0.03	4	0.04	0.03	0.03
113	0.49	0.36	0.40	74	0.64	0.49	0.54	39	0.34	0.24	0.27
32	0.14	0.09	0.11	18	0.15	0.10	0.12	14	0.12	0.08	0.09
47	0.20	0.17	0.18	30	0.26	0.22	0.24	17	0.15	0.12	0.13
10	0.04	0.03	0.03	4	0.03	0.02	0.03	6	0.05	0.04	0.04
1	0.00	0.00	0.00	1	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-

NOTE :

ASR<sup>2</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR<sup>3</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之三 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 97 年【依據WHO 2008 年的分類編修<sup>1</sup>】（續完）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2008 (CONTINUED)

---

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

---

**漿細胞瘤**

Plasma cell neoplasm (ICD-O-3 M-97313、M-97323、M-97333、M-97343)

**其他淋巴增生疾病**

Other LPD

組織細胞與樹突狀細胞瘤

Histiocytic and dendritic cell neoplasms (ICD-O-3 M-97513、M-97553、M-97563、M-97573、M-97583)

**其他與未明示惡性淋巴瘤**

Malignant lymphoma, NOS and others (ICD-O-3 M-95903、M-95913、M-97503、M-97543、M-97603、M-97643)

---

註：1. WHO 2008 年白血病及惡性淋巴瘤分類編修，詳細部位分類請參考第 xiii 頁的說明。

2.3. 年齡標準化發生率<sup>2</sup>係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率<sup>3</sup>係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 <sup>2</sup> ASR <sup>2</sup>	年齡標準化 發生率 <sup>3</sup> ASR <sup>3</sup>
<b>414</b>	<b>1.80</b>	<b>1.25</b>	<b>1.42</b>	<b>247</b>	<b>2.12</b>	<b>1.48</b>	<b>1.71</b>	<b>167</b>	<b>1.46</b>	<b>1.04</b>	<b>1.14</b>
<b>16</b>	<b>0.07</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	<b>11</b>	<b>0.09</b>	<b>0.12</b>	<b>0.11</b>	<b>5</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	<b>0.05</b>
16	0.07	0.08	0.08	11	0.09	0.12	0.11	5	0.04	0.04	0.05
<b>165</b>	<b>0.72</b>	<b>0.53</b>	<b>0.59</b>	<b>94</b>	<b>0.81</b>	<b>0.60</b>	<b>0.67</b>	<b>71</b>	<b>0.62</b>	<b>0.46</b>	<b>0.50</b>

NOTE :

ASR<sup>2</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR<sup>3</sup> : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.