

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 97 年

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2008

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
1	(M-980-998) ⁴ 白血病	(M-980-998) ⁴ 白血病	(M-980-998) ⁴ 白血病	(M-980-998) ⁴ 白血病	(C62) 睪丸	(C73) 甲狀腺
發生數	74	54	63	36	76	168
發生率	6.04	4.82	3.82	2.37	4.10	9.43
百分比	36.27%	38.30%	26.14%	21.56%	13.84%	24.60%
2	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C73) 甲狀腺	(M-980-998) ⁴ 白血病	(C50) 女性乳房
發生數	35	23	33	25	50	108
發生率	2.86	2.05	2.00	1.65	2.70	6.06
百分比	17.16%	16.31%	13.69%	14.97%	9.11%	15.81%
3	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(C22) 肝及肝內膽管	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(C70-C72) 中樞神經系統	(C22) 肝及肝內膽管	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬 韌帶
發生數	17	11	32	19	49	60
發生率	1.39	0.98	1.94	1.25	2.64	3.37
百分比	8.33%	7.80%	13.28%	11.38%	8.93%	8.78%
4	(C48) 後腹膜腔及腹膜	(C47, C49) 結締組織、軟 組織及其他皮 下組織	(C47, C49) 結締組織、軟 組織及其他皮 下組織	(C40-C41), (C47, C49), (C56, C57.0-C57.4) 骨、關節及關節 軟骨，結締組織、 軟組織及其他皮下 組織，卵巢、輸卵 管及寬韌帶並列	(C73) 甲狀腺	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏 淋巴瘤
發生數	13	8	19	14	41	49
發生率	1.06	0.71	1.15	0.92	2.21	2.75
百分比	6.37%	5.67%	7.88%	8.38%	7.47%	7.17%
5	(C22) 肝及肝內膽管	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏 淋巴瘤	(C40-C41) 骨、關節及關節 軟骨	(C40-C41), (C47, C49), (C56, C57.0-C57.4) 骨、關節及關節 軟骨，結締組織、 軟組織及其他皮下 組織，卵巢、輸卵 管及寬韌帶並列	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-980-998) ⁴ 白血病
發生數	12	7	16	14	40	41
發生率	0.98	0.62	0.97	0.92	2.16	2.30
百分比	5.88%	4.96%	6.64%	8.38%	7.29%	6.00%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C00-C14) ⁶	(C50)	(C00-C14) ⁶	(C50)	(C22)	(C50)	(C22)	(C50)	(C33-C34)	(C18-C21)
口腔、口咽及下咽	女性乳房	口腔、口咽及下咽	女性乳房	肝及肝內膽管	女性乳房	肝及肝內膽管	女性乳房	肺、支氣管及氣管	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門
487	815	1,544	2,618	1,979	2,531	1,769	1,243	3,472	2,164
25.98	43.68	81.41	139.43	127.26	159.88	229.94	150.26	432.57	258.52
25.59%	35.97%	27.78%	42.95%	20.84%	31.39%	19.41%	19.02%	19.17%	20.24%
(C22)	(C73)	(C22)	(C18-C21)	(C00-C14) ⁶	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C22)
肝及肝內膽管	甲狀腺	肝及肝內膽管	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	口腔、口咽及下咽	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肝及肝內膽管
287	297	984	493	1,862	933	1,433	924	2,909	1,576
15.31	15.92	51.88	26.26	119.74	58.94	186.27	111.70	362.43	188.28
15.08%	13.11%	17.70%	8.09%	19.61%	11.57%	15.73%	14.14%	16.06%	14.74%
(C11)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C53)	(C18-C21)	(C33-C34)	(C33-C34)	(C22)	(C61)	(C33-C34)
鼻咽	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	子宮頸	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肺、支氣管及氣管	肺、支氣管及氣管	肝及肝內膽管	攝護腺	肺、支氣管及氣管
186	171	506	426	1,208	682	1,328	890	2,565	1,424
9.92	9.17	26.68	22.69	77.68	43.08	172.62	107.59	319.57	170.12
9.77%	7.55%	9.10%	6.99%	12.72%	8.46%	14.57%	13.62%	14.16%	13.32%
(C18-C21)	(C53)	(C15)	(C73)	(C33-C34)	(C54)	(C00-C14) ⁶	(C33-C34)	(C22)	(C50)
結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	子宮頸	食道	甲狀腺	肺、支氣管及氣管	子宮體	口腔、口咽及下咽	肺、支氣管及氣管	肝及肝內膽管	女性乳房
178	150	436	401	925	587	847	782	2,319	819
9.50	8.04	22.99	21.36	59.48	37.08	110.10	94.53	288.92	97.84
9.35%	6.62%	7.84%	6.58%	9.74%	7.28%	9.30%	11.96%	12.81%	7.66%
(C33-C34) ⁵ , (M-959-976) ⁵	(C54)	(C33-C34)	(C54)	(C15)	(C22)	(C61)	(C53)	(C16)	(C44)
肺、支氣管及氣管，非何杰金氏淋巴瘤並列	子宮體	肺、支氣管及氣管	子宮體	食道	肝及肝內膽管	攝護腺	子宮頸	胃	皮膚
83	127	375	351	611	487	779	290	1,278	724
4.43	6.81	19.77	18.69	39.29	30.76	101.26	35.06	159.22	86.49
4.36%	5.60%	6.75%	5.76%	6.44%	6.04%	8.55%	4.44%	7.06%	6.77%

4. 白血病：包括 ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

5. 非何杰金氏淋巴瘤：包括 ICD-O-3 M-959、M-967 - 972、M-975、M-97643；何杰金氏淋巴瘤：包括 ICD-O-3 M-965 - 966。

6. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 97 年（續完）

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2008 (CONTINUED)

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
6	(C74-C75) 其他內分泌腺	(C48), (C74-C75) 後腹膜腔及腹膜，其他內分泌腺並列	(C62) 睪丸	(C40-C41), (C47, C49), (C56, C57.0-C57.4) 骨、關節及關節軟骨，結締組織、軟組織及其他皮下組織，卵巢、輸卵管及寬韌帶並列	(C18-C21) 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	(C18-C21) 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門
發生數	11	6	14	14	38	39
發生率	0.90	0.54	0.85	0.92	2.05	2.19
百分比	5.39%	4.26%	5.81%	8.38%	6.92%	5.71%
7	(C62) 睪丸	(C48), (C74-C75) 後腹膜腔及腹膜，其他內分泌腺並列	(M-965-966) ⁵ 何杰金氏淋巴瘤	(M-965-966) ⁵ 何杰金氏淋巴瘤	(C00-C14) ⁶ 口腔、口咽及下咽	(C70-C72) 中樞神經系統
發生數	10	6	12	13	35	25
發生率	0.82	0.54	0.73	0.86	1.89	1.40
百分比	4.90%	4.26%	4.98%	7.78%	6.38%	3.66%
8	(C47, C49) 結締組織、軟組織及其他皮下組織	(C64.9) 腎	(C37-C38.3, C38.8) 胸腺、心臟與中隔	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(C11) 鼻咽	(C53) 子宮頸
發生數	9	5	7	7	34	24
發生率	0.73	0.45	0.42	0.46	1.83	1.35
百分比	4.41%	3.55%	2.90%	4.19%	6.19%	3.51%
9	(C69) 眼及淚腺	(C40-C41), (C44), (C56, C57.0-C57.4), (C69), (C73) 骨、關節及關節軟骨，皮膚，卵巢、輸卵管及寬韌帶，眼及淚腺，甲狀腺並列	(C48), (C73) 後腹膜腔及腹膜，甲狀腺並列	(C25), (C44) 胰，皮膚並列	(C70-C72) 中樞神經系統	(M-965-966) ⁵ 何杰金氏淋巴瘤
發生數	7	3	6	6	29	21
發生率	0.57	0.27	0.36	0.40	1.56	1.18
百分比	3.43%	2.13%	2.49%	3.59%	5.28%	3.07%
10	(C64.9) 腎	(C40-C41), (C44), (C56, C57.0-C57.4), (C69), (C73) 骨、關節及關節軟骨，皮膚，卵巢、輸卵管及寬韌帶，眼及淚腺，甲狀腺並列	(C48), (C73) 後腹膜腔及腹膜，甲狀腺並列	(C25), (C44) 胰，皮膚並列	(C40-C41) 骨、關節及關節軟骨	(C44) 皮膚
發生數	4	3	6	6	23	20
發生率	0.33	0.27	0.36	0.40	1.24	1.12
百分比	1.96%	2.13%	2.49%	3.59%	4.19%	2.93%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C33-C34), (M-959-976) ⁵	(C56, C57.0- C57.4)	(C11)	(C33-C34)	(C16)	(C53)	(C16)	(C16)	(C67)	(C16)
肺、支氣管 及氣管， 非何杰金氏 淋巴瘤並列	卵巢、輸 卵管及寬 韌帶	鼻咽	肺、支氣 管及氣管	胃	子宮頸	胃	胃	膀胱	胃
83	114	368	350	383	471	403	245	796	588
4.43	6.11	19.40	18.64	24.63	29.75	52.38	29.62	99.17	70.25
4.36%	5.03%	6.62%	5.74%	4.03%	5.84%	4.42%	3.75%	4.40%	5.50%
(M-980-998) ⁴	(C33-C34)	(C16)	(C56, C57.0- C57.4)	(C11)	(C73)	(C15)	(C54)	(C44)	(C65-C66, C68)
白血病	肺、支氣 管及氣管	胃	卵巢、輸 卵管及寬 韌帶	鼻咽	甲狀腺	食道	子宮體	皮膚	腎盂及其 他泌尿器 官
64	76	192	292	310	366	374	219	735	389
3.41	4.07	10.12	15.55	19.93	23.12	48.61	26.47	91.57	46.47
3.36%	3.35%	3.45%	4.79%	3.27%	4.54%	4.10%	3.35%	4.06%	3.64%
(C44)	(M-980-998) ⁴	(M-959-976) ⁵	(C16)	(C61)	(C56, C57.0- C57.4)	(C67)	(C44)	(C00-C14) ⁶	(C53)
皮膚	白血病	非何杰金氏 淋巴瘤	胃	攝護腺	卵巢、輸 卵管及寬 韌帶	膀胱	皮膚	口腔、口 咽及下咽	子宮頸
62	68	126	162	245	342	338	189	572	364
3.31	3.64	6.64	8.63	15.75	21.60	43.93	22.85	71.26	43.49
3.26%	3.00%	2.27%	2.66%	2.58%	4.24%	3.71%	2.89%	3.16%	3.40%
(C73)	(C11)	(C44)	(C22)	(C67)	(C16)	(C44)	(C65-C66, C68)	(M-959-976) ⁵	(C25)
甲狀腺	鼻咽	皮膚	肝及肝內 膽管	膀胱	胃	皮膚	腎盂及其他 泌尿器官	非何杰金氏 淋巴瘤	胰
61	62	111	139	226	225	235	178	423	326
3.25	3.32	5.85	7.40	14.53	14.21	30.55	21.52	52.70	38.95
3.21%	2.95%	2.00%	2.28%	2.38%	2.79%	2.58%	2.72%	2.34%	3.05%
(C15)	(M-959-976) ⁵	(C73)	(C11)	(M-959-976) ⁵	(M-959-976) ⁵	(C25)	(C73)	(C25)	(C67)
食道	非何杰金 氏淋巴瘤	甲狀腺	鼻咽	非何杰金氏 淋巴瘤	非何杰金氏 淋巴瘤	胰	甲狀腺	胰	膀胱
56	55	109	133	216	176	218	174	421	319
2.99	2.95	5.75	7.08	13.89	11.12	28.34	21.03	52.45	38.11
2.94%	2.43%	1.96%	2.18%	2.28%	2.18%	2.39%	2.66%	2.32%	2.98%

4. 白血病：包括 ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

5. 非何杰金氏淋巴瘤：包括 ICD-O-3 M-959、M-967 - 972、M-975、M-97643；何杰金氏淋巴瘤：包括 ICD-O-3 M-965 - 966。

6. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。