

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 98 年

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2009

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
1	(M-980-998) ⁴ 白血病	(M-980-998) ⁴ 白血病	(M-980-998) ⁴ 白血病	(M-980-998) ⁴ 白血病	(C62) 睪丸	(C73) 甲狀腺
發生數	70	52	67	42	69	182
發生率	5.94	4.82	4.10	2.79	3.82	10.48
百分比	38.46%	34.90%	26.80%	20.79%	12.04%	25.14%
2	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C70-C72) 中樞神經系統	(C73) 甲狀腺	(C22) , (M-980-998) ⁴ 肝及肝內膽管， 白血病並列	(C50) 女性乳房
發生數	37	25	35	31	52	125
發生率	3.14	2.32	2.14	2.06	2.88	7.20
百分比	20.33%	16.78%	14.00%	15.35%	9.08%	17.27%
3	(C74-C75) , (M-959-976) ⁵ 其他內分泌腺， 非何杰金氏淋巴 瘤並列	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(C70-C72) 中樞神經系統	(C22) , (M-980-998) ⁴ 肝及肝內膽管， 白血病並列	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬 韌帶
發生數	12	21	28	22	52	70
發生率	1.02	1.95	1.71	1.46	2.88	4.03
百分比	6.59%	14.09%	11.20%	10.89%	9.08%	9.67%
4	(C74-C75) , (M-959-976) ⁵ 其他內分泌腺， 非何杰金氏淋巴 瘤並列	(C69) 眼及淚腺	(C40-C41) 骨、關節及關節 軟骨	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏 淋巴瘤	(C18-C21) 結腸、直腸、乙 狀結腸連結部及 肛門
發生數	12	9	24	19	49	46
發生率	1.02	0.83	1.47	1.26	2.72	2.65
百分比	6.59%	6.04%	9.60%	9.41%	8.55%	6.35%
5	(C47, C49) 結締組織、軟組織 及其他皮下組織	(C48) 後腹膜腔及腹膜	(C48) , (C47, C49) 後腹膜腔及腹 膜，結締組織、 軟組織及其他皮 下組織並列	(C40-C41) , (C56, C57.0-C57.4) 骨、關節及關節 軟骨，卵巢、輸卵 管及寬韌帶並列	(C70-C72) 中樞神經系統	(M-980-998) ⁴ 白血病
發生數	9	7	12	17	44	41
發生率	0.76	0.65	0.73	1.13	2.44	2.36
百分比	4.95%	4.70%	4.80%	8.42%	7.68%	5.66%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C00-C14) ⁶	(C50)	(C00-C14) ⁶	(C50)	(C22)	(C50)	(C22)	(C50)	(C33-C34)	(C18-C21)
口腔、口咽及下咽	女性乳房	口腔、口咽及下咽	女性乳房	肝及肝內膽管	女性乳房	肝及肝內膽管	女性乳房	肺、支氣管及氣管	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門
549	849	1,754	2,732	2,017	2,773	1,894	1,439	3,774	2,395
29.05	44.75	92.71	145.19	125.31	168.68	234.31	166.07	461.00	273.74
27.04%	35.84%	29.90%	42.99%	19.54%	30.69%	18.31%	19.96%	19.40%	19.75%
(C22)	(C73)	(C22)	(C73)	(C00-C14) ⁶	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C33-C34)
肝及肝內膽管	甲狀腺	肝及肝內膽管	甲狀腺	口腔、口咽及下咽	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肺、支氣管及氣管
283	348	983	485	1,961	1,045	1,700	1,172	3,190	1,716
14.97	18.34	51.96	25.78	121.83	63.57	210.31	135.26	389.66	196.13
13.94%	14.69%	16.75%	7.63%	19.00%	11.56%	16.44%	16.26%	16.40%	14.15%
(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C33-C34)	(C33-C34)	(C33-C34)	(C61)	(C22)
結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肺、支氣管及氣管	肺、支氣管及氣管	肺、支氣管及氣管	攝護腺	肝及肝內膽管
202	195	528	483	1,483	851	1,446	903	2,723	1,692
10.69	10.28	27.91	25.67	92.13	51.77	178.88	104.21	332.62	193.39
9.95%	8.23%	9.00%	7.60%	14.37%	9.42%	13.98%	12.53%	14.00%	13.96%
(C11)	(C53)	(C15)	(C53)	(C33-C34)	(C54)	(C00-C14) ⁶	(C22)	(C22)	(C50)
鼻咽	子宮頸	食道	子宮頸	肺、支氣管及氣管	子宮體	口腔、口咽及下咽	肝及肝內膽管	肝及肝內膽管	女性乳房
177	157	409	396	1,032	618	1,023	901	2,506	1,008
9.37	8.28	21.62	21.05	64.11	37.59	126.55	103.98	306.11	115.21
8.72%	6.63%	6.97%	6.23%	10.00%	6.84%	9.89%	12.50%	12.88%	8.31%
(C73)	(C56, C57.0-C57.4)	(C33-C34)	(C54)	(C15)	(C22)	(C61)	(C53)	(C16)	(C44)
甲狀腺	卵巢、輸卵管及寬韌帶	肺、支氣管及氣管	子宮體	食道	肝及肝內膽管	攝護腺	子宮頸	胃	皮膚
103	123	385	369	653	530	975	304	1,309	809
5.45	6.48	20.35	19.61	40.57	32.24	120.62	35.08	159.90	92.47
5.07%	5.19%	6.56%	5.81%	6.33%	5.87%	9.43%	4.22%	6.73%	6.67%

4. 白血病：包括 ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

5. 非何杰金氏淋巴瘤：包括 ICD-O-3 M-959、M-967 - 972、M-975、M-97643；何杰金氏淋巴瘤：包括 ICD-O-3 M-965 - 966。

6. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 98 年（續完）

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2009 (CONTINUED)

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
6	(C22) 肝及肝內膽管	(C40-C41), (C47, C49) 骨、關節及關節軟骨，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C48), (C47, C49) 後腹膜腔及腹膜，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C40-C41), (C56, C57.0-C57.4) 骨、關節及關節軟骨，卵巢、輸卵管及寬韌帶並列	(C18-C21) 結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	(M-965-966) ⁵ 何杰金氏淋巴瘤
發生數	8	6	12	17	43	30
發生率	0.68	0.56	0.73	1.13	2.38	1.73
百分比	4.40%	4.03%	4.80%	8.42%	7.50%	4.14%
7	(C48), (C62) 後腹膜腔及腹膜，睪丸並列	(C40-C41), (C47, C49) 骨、關節及關節軟骨，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C62) 睪丸	(M-965-966) ⁵ 何杰金氏淋巴瘤	(C11) 鼻咽	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤
發生數	6	6	10	12	40	28
發生率	0.51	0.56	0.61	0.80	2.22	1.61
百分比	3.30%	4.03%	4.00%	5.94%	6.98%	3.87%
8	(C48), (C62) 後腹膜腔及腹膜，睪丸並列	(C74-C75) 其他內分泌腺	(C11), (M-965-966) ⁵ 鼻咽，何杰金氏淋巴瘤並列	(C07-C08), (C47, C49) 主唾液腺，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C44) 皮膚	(C70-C72) 中樞神經系統
發生數	6	5	8	7	34	22
發生率	0.51	0.46	0.49	0.47	1.88	1.27
百分比	3.30%	3.36%	3.20%	3.47%	5.93%	3.04%
9	(C73) 甲狀腺	(C22), (C64.9) 肝及肝內膽管，腎並列	(C11), (M-965-966) ⁵ 鼻咽，何杰金氏淋巴瘤並列	(C07-C08), (C47, C49) 主唾液腺，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C73) 甲狀腺	(C44), (C53) 皮膚，子宮頸並列
發生數	5	4	8	7	33	18
發生率	0.42	0.37	0.49	0.47	1.83	1.04
百分比	2.75%	2.68%	3.20%	3.47%	5.76%	2.49%
10	(C64.9) 腎	(C22), (C64.9) 肝及肝內膽管，腎並列	(C37-C38.3, C38.8), (C44), (C73) 胸腺、心臟與中隔，皮膚，甲狀腺並列	(C44) 皮膚	(C00-C14) ⁶ , (C47, C49) 口腔、口咽及下咽，結締組織、軟組織及其他皮下組織並列	(C44), (C53) 皮膚，子宮頸並列
發生數	4	4	7	5	25	18
發生率	0.34	0.37	0.43	0.33	1.39	1.04
百分比	2.20%	2.68%	2.80%	2.48%	4.36%	2.49%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C33-C34) 肺、支氣管及氣管	(C54) 子宮體	(C11) 鼻咽	(C33-C34) 肺、支氣管及氣管	(C16) 胃	(C53) 子宮頸	(C16) 胃	(C16) 胃	(C44) 皮膚	(C16) 胃
89 4.71 4.38%	116 6.11 4.90%	360 19.03 6.14%	354 18.81 5.57%	396 24.60 3.84%	505 30.72 5.59%	456 56.41 4.41%	249 28.74 3.45%	829 101.26 4.26%	683 78.06 5.63%
(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(C33-C34) 肺、支氣管及氣管	(C16) 胃	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C11) 鼻咽	(C73) 甲狀腺	(C15) 食道	(C54) 子宮體	(C67) 膀胱	(C53) 子宮頸
68 3.60 3.35%	74 3.90 3.12%	185 9.78 3.15%	297 15.78 4.67%	309 19.20 2.99%	449 27.31 4.97%	382 47.26 3.69%	236 27.24 3.27%	800 97.72 4.11%	416 47.55 3.43%
(M-980-998) ⁴ 白血病	(C11) 鼻咽	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(C16) 胃	(C61) 攝護腺	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬韌帶	(C44) 皮膚	(C44) 皮膚	(C00-C14) ⁶ 口腔、口咽及下咽	(C65-C66, C68) 腎盂及其他泌尿器官
67 3.55 3.30%	64 3.37 2.70%	134 7.08 2.28%	170 9.03 2.68%	290 18.02 2.81%	326 19.83 3.61%	306 37.85 2.96%	209 24.12 2.90%	612 74.76 3.15%	402 45.95 3.32%
(C15) 食道	(M-980-998) ⁴ 白血病	(C73) 甲狀腺	(C22) 肝及肝內膽管	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(C16) 胃	(C67) 膀胱	(C73) 甲狀腺	(C25) 胰	(C25) 胰
65 3.44 3.20%	58 3.06 2.45%	133 7.03 2.27%	142 7.55 2.23%	256 15.90 2.48%	282 17.15 3.12%	288 35.63 2.78%	200 23.08 2.77%	460 56.19 2.36%	376 42.98 3.10%
(C44) 皮膚	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(M-980-998) ⁴ 白血病	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(C67) 膀胱	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(C25) 胰	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(C67) 膀胱
60 3.17 2.96%	56 2.95 2.36%	125 6.61 2.13%	111 5.90 1.75%	237 14.72 2.30%	203 12.35 2.25%	231 28.58 2.23%	192 22.16 2.66%	433 52.89 2.23%	346 39.55 2.85%

4. 白血病：包括 ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

5. 非何杰金氏淋巴瘤：包括 ICD-O-3 M-959、M-967 - 972、M-975、M-97643；何杰金氏淋巴瘤：包括 ICD-O-3 M-965 - 966。

6. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。