

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 94 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE IN VARIOUS ORGANS, 2005

ICD-O-3	原發部位別
C00-C80	全癌症（總計）
C00-C14	唇、口腔及咽
C00-C14 ³	口腔、口咽及下咽
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外）
C01-C02	舌
C03	齒齦
C04	口底
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位
C09-C10	口咽
C12-C13	下咽
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位
C07-C08	主唾液腺
C11	鼻咽
C15-C26, C48	消化器官及腹膜
C15	食道
C16	胃
C17	小腸
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門
C18	結腸
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門
C22	肝及肝內膽管
C23-C24	膽囊及肝外膽管
C25	胰
C48	後腹膜腔及腹膜
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳
C32	喉
C33-C34	肺、支氣管及氣管
C38.4	胸膜
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外）
C42⁴	白血病
C40-C41	骨、關節及關節軟骨
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織

註：1.2. 年齡標準化發生率¹係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率²係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

3. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

4. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

總計				男				女				ICD-O-3
人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	
68,907	302.62	234.21	260.74	39,430	341.02	267.67	298.59	29,477	263.00	201.61	223.32	C00-C80
6,463	28.38	22.40	24.25	5,542	47.93	38.60	41.63	921	8.22	6.35	6.99	C00-C14
4,743	20.83	16.47	17.78	4,310	37.28	30.08	32.36	433	3.86	2.98	3.29	C00-C14 ³
184	0.81	0.65	0.70	161	1.39	1.13	1.22	23	0.21	0.18	0.18	C00
1,363	5.99	4.72	5.10	1,203	10.40	8.35	9.00	160	1.43	1.12	1.22	C01-C02
308	1.35	1.08	1.17	282	2.44	2.00	2.15	26	0.23	0.17	0.19	C03
113	0.50	0.39	0.42	100	0.86	0.69	0.74	13	0.12	0.09	0.10	C04
1,698	7.46	5.89	6.37	1,573	13.60	10.98	11.83	125	1.12	0.84	0.94	C05-C06
472	2.07	1.63	1.76	412	3.56	2.87	3.08	60	0.54	0.41	0.45	C09-C10
560	2.46	1.95	2.10	537	4.64	3.76	4.04	23	0.21	0.16	0.18	C12-C13
45	0.20	0.16	0.17	42	0.36	0.29	0.31	3	0.03	0.02	0.02	C14
190	0.83	0.66	0.73	109	0.94	0.77	0.84	81	0.72	0.55	0.62	C07-C08
1,530	6.72	5.28	5.74	1,123	9.71	7.75	8.42	407	3.63	2.82	3.08	C11
26,923	118.24	91.06	101.96	17,615	152.35	120.56	134.03	9,308	83.05	62.19	70.35	C15-C26, C48
1,495	6.57	5.19	5.64	1,403	12.13	9.87	10.66	92	0.82	0.61	0.69	C15
3,580	15.72	11.37	13.21	2,288	19.79	14.45	16.82	1,292	11.53	8.34	9.59	C16
299	1.31	1.03	1.14	200	1.73	1.40	1.53	99	0.88	0.66	0.74	C17
9,604	42.18	32.11	36.28	5,497	47.54	37.07	41.77	4,107	36.64	27.30	30.87	C18-C21
5,557	24.40	18.38	20.90	3,061	26.47	20.31	23.08	2,496	22.27	16.49	18.72	C18
4,047	17.77	13.73	15.38	2,436	21.07	16.77	18.69	1,611	14.37	10.81	12.16	C19-C21
9,916	43.55	34.54	37.99	7,159	61.92	50.52	55.10	2,757	24.60	18.90	21.16	C22
704	3.09	2.34	2.67	354	3.06	2.39	2.70	350	3.12	2.31	2.64	C23-C24
1,163	5.11	3.80	4.36	646	5.59	4.29	4.87	517	4.61	3.33	3.87	C25
135	0.59	0.56	0.57	58	0.50	0.49	0.49	77	0.69	0.62	0.64	C48
27	0.12	0.10	0.11	10	0.09	0.07	0.08	17	0.15	0.12	0.13	C26
9,309	40.88	30.50	34.89	6,375	55.14	41.65	47.64	2,934	26.18	19.48	22.13	C30-C39
178	0.78	0.62	0.68	132	1.14	0.93	1.02	46	0.41	0.32	0.35	C30-C31
540	2.37	1.85	2.04	518	4.48	3.59	3.94	22	0.20	0.15	0.17	C32
8,312	36.50	26.96	31.05	5,566	48.14	35.94	41.42	2,746	24.50	18.09	20.64	C33-C34
31	0.14	0.11	0.12	20	0.17	0.15	0.16	11	0.10	0.08	0.08	C38.4
248	1.09	0.94	0.99	139	1.20	1.04	1.11	109	0.97	0.85	0.88	C37-C38.3, C38.8
439	1.93	1.46	1.66	257	2.22	1.75	1.97	182	1.62	1.18	1.36	C42
1,464	6.43	5.96	6.17	857	7.41	6.76	7.06	607	5.42	5.16	5.26	C42⁴
176	0.77	0.76	0.77	108	0.93	0.91	0.93	68	0.61	0.61	0.61	C40-C41
406	1.78	1.53	1.63	233	2.02	1.71	1.84	173	1.54	1.34	1.42	C47, C49

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 94 年（續完）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE IN VARIOUS ORGANS, 2005 (CONCLUDED)

ICD-O-3	原發部位別
C44	皮膚
C44 ⁵	皮膚，惡性黑色素瘤
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤
C50	女性乳房
C50	男性乳房
C51-C58	女性生殖器官
C55	子宮，未明示部位
C53	子宮頸
C54	子宮體
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官
C60-C63	男性生殖器官
C61	攝護腺
C62	睪丸
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官
C64-C68	泌尿器官
C67	膀胱
C64	腎
C65	腎盂
C66	輸尿管
C68.0-C68.1	尿道及其週邊腺體
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變
C68.9	泌尿系統，未明示部位
C69	眼及淚腺
C70-C72	中樞神經系統
C71	腦
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位
C73	甲狀腺
C74-C75	其他內分泌腺
C76	其他分界不明的部位
C77	淋巴結
C80	不明原發部位

註：1.2. 年齡標準化發生率¹係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率²係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

5. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

總計				男				女				ICD-O-3
人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	
2,177	9.56	7.12	8.16	1,138	9.84	7.57	8.57	1,039	9.27	6.69	7.75	C44
158	0.69	0.51	0.59	88	0.76	0.54	0.64	70	0.62	0.48	0.54	C44 ⁵
2,019	8.87	6.61	7.57	1,050	9.08	7.03	7.93	969	8.65	6.21	7.22	C44
6,594	58.83	45.54	49.19	-	-	-	-	6,594	58.83	45.54	49.19	C50
48	0.42	0.33	0.37	48	0.42	0.33	0.37	-	-	-	-	C50
4,000	35.69	27.39	29.97	-	-	-	-	4,000	35.69	27.39	29.97	C51-C58
5	0.04	0.03	0.04	-	-	-	-	5	0.04	0.03	0.04	C55
1,977	17.64	13.34	14.74	-	-	-	-	1,977	17.64	13.34	14.74	C53
987	8.81	6.86	7.37	-	-	-	-	987	8.81	6.86	7.37	C54
894	7.98	6.29	6.81	-	-	-	-	894	7.98	6.29	6.81	C56, C57.0-C57.4
137	1.22	0.88	1.02	-	-	-	-	137	1.22	0.88	1.02	C51-C52, C57.7-C57.9
2,930	25.34	18.26	21.59	2,930	25.34	18.26	21.59	-	-	-	-	C60-C63
2,704	23.39	16.47	19.72	2,704	23.39	16.47	19.72	-	-	-	-	C61
142	1.23	1.20	1.22	142	1.23	1.20	1.22	-	-	-	-	C62
84	0.73	0.59	0.65	84	0.73	0.59	0.65	-	-	-	-	C60, C63
3,715	16.32	12.28	13.98	2,350	20.32	15.47	17.61	1,365	12.18	9.14	10.36	C64-C68
1,900	8.34	6.14	7.10	1,363	11.79	8.74	10.13	537	4.79	3.59	4.08	C67
733	3.22	2.53	2.79	479	4.14	3.30	3.62	254	2.27	1.77	1.95	C64
512	2.25	1.71	1.93	244	2.11	1.66	1.85	268	2.39	1.76	2.02	C65
356	1.56	1.19	1.35	149	1.29	1.01	1.14	207	1.85	1.36	1.56	C66
30	0.13	0.10	0.12	19	0.16	0.13	0.15	11	0.10	0.08	0.09	C68.0-C68.1
39	0.17	0.13	0.15	22	0.19	0.15	0.17	17	0.15	0.11	0.13	C68.8
145	0.64	0.47	0.54	74	0.64	0.48	0.55	71	0.63	0.46	0.53	C68.9
74	0.32	0.36	0.34	50	0.43	0.47	0.45	24	0.21	0.25	0.23	C69
677	2.97	2.75	2.83	374	3.23	2.98	3.09	303	2.70	2.53	2.56	C70-C72
603	2.65	2.45	2.52	338	2.92	2.70	2.79	265	2.36	2.21	2.24	C71
74	0.32	0.30	0.31	36	0.31	0.28	0.30	38	0.34	0.32	0.33	C70, C72
1,505	6.61	5.32	5.78	359	3.10	2.49	2.73	1,146	10.22	8.17	8.88	C73
49	0.22	0.19	0.20	27	0.23	0.21	0.22	22	0.20	0.17	0.18	C74-C75
10	0.04	0.04	0.04	4	0.03	0.03	0.03	6	0.05	0.05	0.05	C76
924	4.06	3.32	3.62	546	4.72	3.88	4.25	378	3.37	2.75	2.99	C77
1,024	4.50	3.31	3.81	617	5.34	4.02	4.59	407	3.63	2.62	3.05	C80

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 94 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2005

白血病及惡性淋巴瘤

白血病 (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)

急性淋巴芽細胞白血病 (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)

慢性淋巴球白血病 (ICD-O-3 M-98233)

急性骨髓樣白血病 (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)

慢性骨髓樣白血病 (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)

其他類型白血病³

惡性淋巴瘤 (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

何杰金氏淋巴瘤 (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)

非何杰金氏淋巴瘤 (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

註：1.2. 年齡標準化發生率¹係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率²係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

3. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

總計				男				女			
人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²	人數	粗發生率	年齡標準化發生率 ¹	年齡標準化發生率 ²
1,464	6.43	5.96	6.17	857	7.41	6.76	7.06	607	5.42	5.16	5.26
238	1.05	1.57	1.34	131	1.13	1.65	1.42	107	0.95	1.49	1.27
93	0.41	0.31	0.36	59	0.51	0.41	0.46	34	0.30	0.23	0.26
560	2.46	2.05	2.22	317	2.74	2.24	2.47	243	2.17	1.86	1.98
161	0.71	0.58	0.63	104	0.90	0.74	0.81	57	0.51	0.41	0.45
412	1.81	1.45	1.61	246	2.13	1.73	1.91	166	1.48	1.17	1.30
1,802	7.91	6.36	7.00	1,071	9.26	7.56	8.31	731	6.52	5.16	5.69
112	0.49	0.45	0.47	66	0.57	0.53	0.55	46	0.41	0.37	0.39
1,690	7.42	5.91	6.53	1,005	8.69	7.04	7.76	685	6.11	4.79	5.30