

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 96 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C00-C80	全癌症（總計） ALL SITES
C00-C14	唇、口腔及咽 LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C00-C14 ⁴	口腔、口咽及下咽 ORAL CAVITY, OROPHARYNX AND HYPOPHARYNX
C00	唇（唇的皮膚 C44.0 除外） LIP (excludes skin of lip C44.0)
C01-C02	舌 TONGUE
C03	齒齦 GUM
C04	口底 FLOOR OF MOUTH
C05-C06	口腔之其他及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH
C09-C10	口咽 OROPHARYNX
C12-C13	下咽 HYPOPHARYNX
C14	咽和唇、口腔及咽之分界不明部位 PHARYNX AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX
C07-C08	主唾液腺 MAJOR SALIVARY GLANDS
C11	鼻咽 NASOPHARYNX
C15-C26, C48	消化器官及腹膜 DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM
C15	食道 ESOPHAGUS
C16	胃 STOMACH
C17	小腸 SMALL INTESTINE

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2.3. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

4. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

5. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
75,768	330.02	241.99	270.07	43,330	373.25	278.71	312.09	32,438	285.81	207.19	229.74	C00-C80
7,217	31.44	23.79	25.77	6,281	54.11	41.92	45.24	936	8.25	5.99	6.63	C00-C14
5,458	23.77	18.01	19.46	5,006	43.12	33.46	36.02	452	3.98	2.86	3.19	C00-C14 ⁴
185	0.81	0.61	0.66	163	1.40	1.10	1.18	22	0.19	0.14	0.15	C00
1,590	6.93	5.22	5.68	1,395	12.02	9.22	10.01	195	1.72	1.27	1.40	C01-C02
378	1.65	1.27	1.36	331	2.85	2.29	2.42	47	0.41	0.29	0.33	C03
127	0.55	0.42	0.45	121	1.04	0.82	0.87	6	0.05	0.04	0.04	C04
1,874	8.16	6.18	6.67	1,753	15.10	11.71	12.60	121	1.07	0.74	0.84	C05-C06
512	2.23	1.68	1.81	472	4.07	3.13	3.37	40	0.35	0.25	0.28	C09-C10
764	3.33	2.53	2.72	745	6.42	5.02	5.39	19	0.17	0.11	0.13	C12-C13
28	0.12	0.10	0.10	26	0.22	0.18	0.19	2	0.02	0.01	0.01	C14
180	0.78	0.59	0.66	108	0.93	0.72	0.80	72	0.63	0.46	0.52	C07-C08
1,579	6.88	5.19	5.65	1,167	10.05	7.74	8.41	412	3.63	2.68	2.93	C11
28,728	125.13	90.58	101.81	18,796	161.91	121.62	135.58	9,932	87.51	60.68	69.10	C15-C26, C48
1,825	7.95	5.92	6.45	1,685	14.51	11.16	12.10	140	1.23	0.82	0.95	C15
3,612	15.73	10.70	12.48	2,311	19.91	13.89	16.18	1,301	11.46	7.63	8.87	C16
309	1.35	0.97	1.10	190	1.640	1.23	1.38	119	1.05	0.72	0.83	C17

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 96 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C18-C21	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門 COLON, RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C18	結腸 COLON
C19-C21	直腸、乙狀結腸連結部及肛門 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS
C22	肝及肝內膽管 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS
C23-C24	膽囊及肝外膽管 GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS
C25	胰 PANCREAS
C48	後腹膜腔及腹膜 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM
C26	消化器官之其他部位及與腹膜分界不明部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM
C30-C39	呼吸系統及胸腔內器官 RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS
C30-C31	鼻腔、副竇、中耳及內耳 NASAL CAVITIES, ACCESSORY SINUSES, MIDDLE EAR AND INNER EAR
C32	喉 LARYNX
C33-C34	肺、支氣管及氣管 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG
C38.4	胸膜 PLEURA
C37-C38.3, C38.8	胸腺、心臟及縱膈 THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM
C42	造血系統及網狀內皮系統（白血病除外） HEMATOPOIETIC AND RETICULOENDOTHELIAL SYSTEMS (excludes LEUKEMIA)
C42⁵	白血病 LEUKEMIA
C40-C41	骨、關節及關節軟骨 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2.3. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

5. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
10,511	45.78	32.73	37.09	6,040	52.03	38.44	43.41	4,471	39.39	27.32	31.05	C18-C21
6,127	26.69	18.93	21.55	3,441	29.64	21.69	24.64	2,686	23.67	16.32	18.61	C18
4,384	19.10	13.80	15.53	2,599	22.39	16.75	18.77	1,785	15.73	11.00	12.44	C19-C21
10,110	44.04	33.00	36.37	7,210	62.11	48.33	52.77	2,900	25.55	18.20	20.47	C22
804	3.50	2.37	2.77	439	3.78	2.62	3.06	365	3.22	2.12	2.49	C23-C24
1,380	6.01	4.21	4.84	819	7.06	5.17	5.86	561	4.94	3.30	3.85	C25
140	0.61	0.57	0.58	83	0.71	0.68	0.69	57	0.50	0.46	0.46	C48
38	0.17	0.12	0.13	19	0.16	0.11	0.13	19	0.17	0.12	0.13	C26
10,065	43.84	30.70	35.25	6,738	58.04	41.46	47.74	3,327	29.31	20.38	23.12	C30-C39
150	0.65	0.50	0.54	109	0.94	0.72	0.80	41	0.36	0.28	0.30	C30-C31
559	2.43	1.76	1.96	534	4.60	3.44	3.82	25	0.22	0.15	0.17	C32
9,059	39.46	27.41	31.63	5,898	50.81	35.88	41.61	3,161	27.85	19.30	21.94	C33-C34
55	0.24	0.19	0.21	45	0.39	0.33	0.35	10	0.09	0.06	0.07	C38.4
242	1.05	0.84	0.91	152	1.31	1.09	1.16	90	0.79	0.60	0.65	C37-C38.3, C38.8
392	1.71	1.23	1.39	222	1.91	1.41	1.60	170	1.50	1.06	1.19	C42
1,513	6.59	5.89	6.11	915	7.88	6.90	7.26	598	5.27	4.88	4.97	C42⁵
157	0.68	0.65	0.67	84	0.72	0.68	0.70	73	0.64	0.61	0.63	C40-C41

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 96 年（續）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C47, C49	結締組織、軟組織及其他皮下組織 CONNECTIVE, SUBCUTANEOUS AND OTHER SOFT TISSUES
C44	皮膚 SKIN
C44 ⁶	皮膚，惡性黑色素瘤 SKIN, MALIGNANT MELANOMA
C44	皮膚，非惡性黑色素瘤 SKIN (excludes MALIGNANT MELANOMA)
C50	女性乳房 FEMALE BREAST
C50	男性乳房 MALE BREAST
C51-C58	女性生殖器官 FEMALE GENITAL ORGANS
C55	子宮，未明示部位 UTERUS, NOS
C53	子宮頸 CERVIX UTERI
C54	子宮體 CORPUS UTERI
C56, C57.0-C57.4	卵巢、輸卵管及寬韌帶 OVARY, FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT
C51-C52, C57.7-C57.9	陰道、外陰部及其他未詳細說明之女性生殖器官 VAGINA, VULVA, OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS
C60-C63	男性生殖器官 MALE GENITAL ORGANS
C61	攝護腺 PROSTATE GLAND
C62	睪丸 TESTIS
C60, C63	陰莖及其他男性生殖器官 PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2.3. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

6. 皮膚，惡性黑色素瘤：ICD-O-3 C44， M-87203 - M-87903。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
409	1.78	1.47	1.57	252	2.17	1.77	1.92	157	1.38	1.17	1.23	C47, C49
2,427	10.57	7.24	8.44	1,314	11.32	8.05	9.30	1,113	9.81	6.48	7.63	C44
192	0.84	0.62	0.69	106	0.91	0.70	0.78	86	0.76	0.54	0.61	C44 ⁶
2,235	9.74	6.62	7.75	1,208	10.41	7.35	8.52	1,027	9.05	5.93	7.02	C44
7,502	66.10	49.28	53.09	-	-	-	-	7,502	66.10	49.28	53.09	C50
35	0.30	0.22	0.25	35	0.30	0.22	0.25	-	-	-	-	C50
4,126	36.35	26.77	29.26	-	-	-	-	4,126	36.35	26.77	29.26	C51-C58
11	0.10	0.08	0.08	-	-	-	-	11	0.10	0.08	0.08	C55
1,749	15.41	11.06	12.23	-	-	-	-	1,749	15.41	11.06	12.23	C53
1,165	10.26	7.67	8.26	-	-	-	-	1,165	10.26	7.67	8.26	C54
1,047	9.23	7.01	7.61	-	-	-	-	1,047	9.23	7.01	7.61	C56, C57.0-C57.4
154	1.36	0.94	1.08	-	-	-	-	154	1.36	0.94	1.08	C51-C52, C57.7-C57.9
3,588	30.91	21.26	25.26	3,588	30.91	21.26	25.26	-	-	-	-	C60-C63
3,367	29.00	19.63	23.50	3,367	29.00	19.63	23.5	-	-	-	-	C61
142	1.22	1.14	1.19	142	1.22	1.14	1.19	-	-	-	-	C62
79	0.68	0.49	0.57	79	0.68	0.49	0.57	-	-	-	-	C60, C63

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之一 台灣癌症申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按原發部位、性別分類（每 10 萬人口），民國 96 年（續完）

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES AND GENDER, 2007 (CONTINUED)

ICD-O-3	原發部位別 PRIMARY ANATOMIC SITES
C64-C68	泌尿器官 URINARY TRACT
C67	膀胱 BLADDER
C64	腎 KIDNEY
C65	腎盂 RENAL PELVIS
C66	輸尿管 URETER
C68.0-C68.1	尿道及其周邊腺體 URETHRA AND PARAURETHRAL GLAND
C68.8	跨越泌尿器官兩個以上相鄰部位之病變 OVERLAPPING LESION OF URINARY ORGANS
C68.9	泌尿系統，未明示部位 URINARY SYSTEM, NOS
C69	眼及淚腺 EYE AND LACRIMAL GLAND
C70-C72	中樞神經系統 BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM
C71	腦 BRAIN
C70, C72	其他神經系統及未詳細說明部位 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM
C73	甲狀腺 THYROID GLAND
C74-C75	其他內分泌腺 OTHER ENDOCRINE GLANDS
C76	其他分界不明的部位 OTHER AND ILL-DEFINED SITES
C80	不明原發部位 UNKNOWN PRIMARY SITES
	惡性淋巴瘤 MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2.3. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE				ICD-O-3
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	
4,022	17.52	12.50	14.21	2,546	21.93	15.93	18.14	1,476	13.00	9.18	10.39	C64-C68
2,050	8.93	6.13	7.12	1,457	12.55	8.84	10.25	593	5.22	3.53	4.08	C67
798	3.48	2.62	2.88	522	4.50	3.39	3.76	276	2.43	1.87	2.02	C64
587	2.56	1.91	2.12	300	2.58	2.02	2.23	287	2.53	1.80	2.03	C65
403	1.76	1.25	1.43	169	1.46	1.06	1.21	234	2.06	1.43	1.64	C66
15	0.07	0.05	0.05	12	0.10	0.07	0.08	3	0.03	0.02	0.02	C68.0-C68.1
18	0.08	0.06	0.06	10	0.09	0.05	0.07	8	0.07	0.05	0.06	C68.8
151	0.66	0.48	0.54	76	0.65	0.50	0.55	75	0.66	0.47	0.53	C68.9
50	0.22	0.29	0.25	28	0.24	0.36	0.31	22	0.19	0.20	0.20	C69
643	2.80	2.46	2.56	365	3.14	2.62	2.81	278	2.45	2.33	2.34	C70-C72
572	2.49	2.20	2.29	330	2.84	2.37	2.55	242	2.13	2.05	2.05	C71
71	0.31	0.26	0.27	35	0.30	0.24	0.26	36	0.32	0.27	0.29	C70, C72
1,837	8.00	6.23	6.79	430	3.70	2.91	3.18	1,407	12.40	9.56	10.40	C73
59	0.26	0.35	0.30	30	0.26	0.38	0.33	29	0.26	0.30	0.27	C74-C75
15	0.07	0.06	0.06	10	0.09	0.08	0.08	5	0.04	0.03	0.03	C76
936	4.08	2.87	3.28	529	4.56	3.34	3.78	407	3.59	2.42	2.79	C80
2,047	8.92	6.82	7.53	1,167	10.05	7.80	8.63	880	7.75	5.85	6.45	

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.

表二之二 台灣白血病及惡性淋巴瘤申報發生人數、粗發生率及年齡標準化發生率按性別分類（每 10 萬人口），民國 96 年

CRUDE AND AGE-STANDARDIZED CANCER INCIDENCE RATE BY GENDER IN LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 2007

白血病及惡性淋巴瘤

HEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TUMORS

白血病

LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893)

急性淋巴芽細胞白血病

ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98353 - M-98373)

慢性淋巴球白血病

CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98233)

急性骨髓樣白血病

ACUTE MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98403、M-98613、M-98663、M-98673、M-98713 - M-98743、M-98953 - M-98973、M-99203)

慢性骨髓樣白血病

CHRONIC MYELOID LEUKEMIA (ICD-O-3 M-98633、M-98753、M-98763、M-99453、M-99463、M-99633)

其他類型白血病⁷

LEUKEMIA excludes Acute lymphoblastic leukemia, Chronic lymphocytic leukemia, acute myeloid leukemia and Chronic myeloid leukemia

惡性淋巴瘤

MALIGNANT LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

何杰金氏淋巴瘤

HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-96503 - M-96673)

非何杰金氏淋巴瘤

NON-HODGKIN LYMPHOMA (ICD-O-3 M-95903 - M-95963、M-96703 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643)

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。惡性淋巴瘤：ICD-O-3 M-95903 - M-97293、M-97503 - M-97583、M-97643。

2.3. 年齡標準化發生率²係使用 1976 年世界標準人口、年齡標準化發生率³係使用 2000 年世界標準人口為標準人口。

5. 白血病：ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

7. 其他類型白血病：除急性淋巴芽細胞白血病、慢性淋巴球白血病、急性骨髓樣白血病、慢性骨髓樣白血病外之所有白血病代碼。

總計 TOTAL				男 MALE				女 FEMALE			
人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³	人數 CASE NUMBER	粗發生率 CRUDE RATE	年齡標準化 發生率 ² ASR ²	年齡標準化 發生率 ³ ASR ³
1,513	6.59	5.89	6.11	915	7.88	6.90	7.26	598	5.27	4.88	4.97
223	0.97	1.50	1.29	125	1.08	1.67	1.42	98	0.86	1.31	1.14
96	0.42	0.28	0.33	70	0.60	0.42	0.49	26	0.23	0.15	0.18
626	2.73	2.22	2.39	373	3.21	2.54	2.79	253	2.23	1.91	2.00
182	0.79	0.63	0.69	111	0.96	0.75	0.83	71	0.63	0.50	0.54
386	1.68	1.26	1.41	236	2.03	1.52	1.72	150	1.32	1.00	1.11
2,047	8.92	6.82	7.53	1,167	10.05	7.80	8.63	880	7.75	5.85	6.45
145	0.63	0.59	0.62	82	0.71	0.65	0.68	63	0.56	0.53	0.56
1,902	8.28	6.23	6.92	1,085	9.35	7.15	7.95	817	7.20	5.32	5.90

NOTE :

ASR² : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 1976 world standard population.

ASR³ : Incidence rates are per 100,000 and are age-standardized to the 2000 world standard population.