

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 96 年

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2007

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
1	(M-980-998) ⁴ 白血病	(M-980-998) ⁴ 白血病	(M-980-998) ⁴ 白血病	(M-980-998) ⁴ 白血病	(M-980-998) ⁴ 白血病	(C73) 甲狀腺
發生數	73	54	45	41	56	153
發生率	5.79	4.69	2.67	2.64	2.97	8.45
百分比	41.95%	42.19%	20.93%	20.50%	11.45%	23.79%
2	(C74-C75) 其他內分泌腺	(C70-C72) 中樞神經系統	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬 韌帶	(C62) 睪丸	(C50) 女性乳房
發生數	14	28	28	30	53	81
發生率	1.11	2.43	1.66	1.93	2.82	4.48
百分比	8.05%	21.88%	13.02%	15.00%	10.84%	12.60%
3	(C70-C72) 中樞神經系統	(C47, C49), (M-959-976) ⁵ 結締組織、軟組 織及其他皮下組 織，非何杰金氏 淋巴瘤並列	(C70-C72) 中樞神經系統	(C73) 甲狀腺	(C22) 肝及肝內膽管	(C56, C57.0-C57.4) 卵巢、輸卵管及寬 韌帶
發生數	13	7	25	26	43	63
發生率	1.03	0.61	1.48	1.67	2.28	3.48
百分比	7.47%	5.47%	11.63%	13.00%	8.79%	9.80%
4	(C69) 眼及淚腺	(C47, C49), (M-959-976) ⁵ 結締組織、軟組 織及其他皮下組 織，非何杰金氏 淋巴瘤並列	(C40-C41) 骨、關節及關節 軟骨	(C70-C72) 中樞神經系統	(C73) 甲狀腺	(M-980-998) ⁴ 白血病
發生數	12	7	20	19	41	46
發生率	0.95	0.61	1.19	1.22	2.18	2.54
百分比	6.90%	5.47%	9.30%	9.50%	8.38%	7.15%
5	(C48), (M-959-976) ⁵ 後腹腔腔及腹膜， 非何杰金氏淋巴瘤 並列	(C74-C75) 其他內分泌腺	(M-965-966) ⁵ 何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏淋巴瘤
發生數	11	6	15	15	38	38
發生率	0.87	0.52	0.89	0.97	2.02	2.10
百分比	6.32%	4.69%	6.98%	7.50%	7.77%	5.91%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C00-C14) ⁶	(C50)	(C00-C14) ⁶	(C50)	(C22)	(C50)	(C22)	(C50)	(C33-C34)	(C18-C21)
口腔、口咽及下咽	女性乳房	口腔、口咽及下咽	女性乳房	肝及肝內膽管	女性乳房	肝及肝內膽管	女性乳房	肺、支氣管及氣管	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門
515	785	1,535	2,458	1,905	2,273	1,810	1,181	3,298	1,938
27.62	42.48	81.02	131.30	127.77	150.21	244.57	148.10	417.22	241.11
27.54%	35.58%	28.00%	42.44%	20.96%	30.34%	20.04%	19.44%	19.42%	19.57%
(C22)	(C73)	(C22)	(C18-C21)	(C00-C14) ⁶	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C18-C21)	(C33-C34)
肝及肝內膽管	甲狀腺	肝及肝內膽管	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	口腔、口咽及下咽	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肺、支氣管及氣管
273	273	1,020	484	1,647	903	1,459	964	2,709	1,435
14.64	14.77	53.84	25.85	110.47	59.67	197.14	120.88	342.71	178.53
14.60%	12.38%	18.60%	8.36%	18.12%	12.05%	16.16%	15.87%	15.95%	14.49%
(C11)	(C53)	(C18-C21)	(C53)	(C18-C21)	(C33-C34)	(C33-C34)	(C22)	(C61)	(C22)
鼻咽	子宮頸	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	子宮頸	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	肺、支氣管及氣管	肺、支氣管及氣管	肝及肝內膽管	攝護腺	肝及肝內膽管
170	169	477	416	1,206	620	1,275	822	2,365	1,380
9.12	9.15	25.18	22.22	80.89	40.97	172.28	103.08	299.19	171.69
9.09%	7.66%	8.70%	7.18%	13.27%	8.28%	14.12%	13.53%	13.93%	13.93%
(C18-C21)	(C18-C21)	(C15)	(C73)	(C33-C34)	(C53)	(C00-C14) ⁶	(C33-C34)	(C22)	(C50)
結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	結腸、直腸、乙狀結腸連結部及肛門	食道	甲狀腺	肺、支氣管及氣管	子宮頸	口腔、口咽及下咽	肺、支氣管及氣管	肝及肝內膽管	女性乳房
157	149	402	367	868	492	804	694	2,149	720
8.42	8.06	21.22	19.60	58.22	32.51	108.64	87.03	271.87	89.58
8.40%	6.75%	7.33%	6.34%	9.55%	6.57%	8.90%	11.42%	12.65%	7.27%
(C73)	(C56, C57.0-C57.4)	(C11)	(C33-C34)	(C15)	(C22)	(C61)	(C53)	(C16)	(C44)
甲狀腺	卵巢、輸卵管及寬韌帶	鼻咽	肺、支氣管及氣管	食道	肝及肝內膽管	攝護腺	子宮頸	胃	皮膚
76	121	379	332	540	475	760	276	1,258	629
4.08	6.55	20.00	17.73	36.22	31.39	102.69	34.61	159.15	78.26
4.06%	5.49%	6.91%	5.73%	5.94%	6.34%	8.42%	4.54%	7.41%	6.35%

4. 白血病：包括 ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

5. 非何杰金氏淋巴瘤：包括 ICD-O-3 M-959、M-967 - 972、M-975、M-97643；何杰金氏淋巴瘤：包括 ICD-O-3 M-965 - 966。

6. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。

表六 台灣 10 種常見癌症申報發生人數按年齡及性別分類，民國 96 年（續完）

RANKING OF CANCER INCIDENCE RATE BY PRIMARY ANATOMIC SITES IN VARIOUS AGE GROUPS, 2007 (CONTINUED)

順位	0-9		10-19		20-29	
	男	女	男	女	男	女
6	(C48) , (M-959-976) ⁵ 後腹膜腔及腹膜， 非何杰金氏淋巴瘤 並列	(C40-C41) , (C56, C57.0-C57.4) 骨、關節及關節 軟骨，卵巢、輸 卵管及寬韌帶 並列	(C47, C49) 結締組織、軟組織 及其他皮下組織	(C40-C41) 骨、關節及關節 軟骨	(C11) 鼻咽	(C18-C21) 結腸、直腸、乙 狀結腸連結部及 肛門
發生數	11	5	11	14	37	31
發生率	0.87	0.43	0.65	0.90	1.97	1.71
百分比	6.32%	3.91%	5.12%	7.00%	7.57%	4.82%
7	(C22) 肝及肝內膽管	(C40-C41) , (C56, C57.0-C57.4) 骨、關節及關節 軟骨，卵巢、輸 卵管及寬韌帶 並列	(C11) 鼻咽	(C44) , (M-965- 966) ⁵ 皮膚，何杰金氏 淋巴瘤並列	(C18-C21) 結腸、直腸、乙 狀結腸連結部及 肛門	(C54) 子宮體
發生數	8	5	10	10	30	28
發生率	0.64	0.43	0.59	0.64	1.59	1.55
百分比	4.60%	3.91%	4.65%	5.00%	6.13%	4.35%
8	(C47, C49) , (C62) , (C64.9) 結締組織、軟組織 及其他皮下組織， 睪丸，腎並列	(C48) , (C64.9) , (C69) 後腹膜腔及腹膜， 腎，眼及淚腺並列	(C62) 睪丸	(C44) , (M-965- 966) ⁵ 皮膚，何杰金氏 淋巴瘤並列	(C00-C14) ⁶ 口腔、口咽及下 咽	(M-965-966) ⁵ 何杰金氏淋巴瘤
發生數	5	4	9	10	28	27
發生率	0.40	0.35	0.53	0.64	1.49	1.49
百分比	2.87%	3.13%	4.19%	5.00%	5.73%	4.20%
9	(C47, C49) , (C62) , (C64.9) 結締組織、軟組織 及其他皮下組織， 睪丸，腎並列	(C48) , (C64.9) , (C69) 後腹膜腔及腹膜， 腎，眼及淚腺並列	(C48) , (C37-C38.3, C38.8) , (C73) 後腹膜腔及腹膜， 胸腺、心臟與 中隔，甲狀腺並列	(C47, C49) 結締組織、軟組 織及其他皮下組 織	(C44) 皮膚	(C22) , (C53) 肝及肝內膽管， 子宮頸並列
發生數	5	4	8	8	22	21
發生率	0.40	0.35	0.47	0.52	1.17	1.16
百分比	2.87%	3.13%	3.72%	4.00%	4.50%	3.27%
10	(C47, C49) , (C62) , (C64.9) 結締組織、軟組織 及其他皮下組織， 睪丸，腎並列	(C48) , (C64.9) , (C69) 後腹膜腔及腹膜， 腎，眼及淚腺並列	(C48) , (C37-C38.3, C38.8) , (C73) 後腹膜腔及腹膜， 胸腺、心臟與 中隔，甲狀腺並列	(C50) 女性乳房	(C70-C72) 中樞神經系統	(C22) , (C53) 肝及肝內膽管， 子宮頸並列
發生數	5	4	8	4	19	21
發生率	0.40	0.35	0.47	0.26	1.01	1.16
百分比	2.87%	3.13%	3.72%	2.00%	3.89%	3.27%

註：1. 自 96 年癌症登記報告起，惡性淋巴瘤從各部位獨立出來計算發生率，並納入排名。

2. 括號內為國際疾病分類-腫瘤學第三版代號，ICD-O-3。

3. 由上至下依序為腫瘤學代號，癌症部位，申報發生數，每 10 萬人口年齡別發生率及占該性別年齡層所有癌症個案之百分比。

30-39		40-49		50-59		60-69		70+	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
(C33-C34), (M-980-998) ⁴ 肺、支氣管 及氣管， 白血病並列	(C54) 子宮體	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C54) 子宮體	(C16) 胃	(C54) 子宮體	(C16) 胃	(C16) 胃	(C67) 膀胱	(C16) 胃
70 3.75 3.74%	106 5.74 4.81%	375 19.79 6.84%	292 15.60 5.04%	362 24.28 3.98%	458 30.27 6.11%	461 62.29 5.11%	200 25.08 3.29%	778 98.42 4.58%	615 76.51 6.21%
(C33-C34), (M-980-998) ⁴ 肺、支氣管 及氣管， 白血病並列	(C33-C34) 肺、支氣 管及氣管	(C16) 胃	(C56, C57.0- C57.4) 卵巢、輸 卵管及寬 韌帶	(C11) 鼻咽	(C73) 甲狀腺	(C15) 食道	(C44), (C54) 皮膚，子 宮體並列	(C44) 皮膚	(C53) 子宮頸
70 3.75 3.74%	70 3.79 3.17%	179 9.45 3.26%	254 13.57 4.39%	326 21.87 3.59%	318 21.01 4.25%	350 47.29 3.88%	185 23.20 3.05%	686 86.78 4.04%	375 46.66 3.79%
(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏 淋巴瘤	(C16) 胃	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏 淋巴瘤	(C16) 胃	(C67) 膀胱	(C56, C57.0- C57.4) 卵巢、輸 卵管及寬 韌帶	(C67) 膀胱	(C44), (C54) 皮膚，子 宮體並列	(C00-C14) ⁶ 口腔、口 咽及下咽	(C65-C66, C68) 腎盂及其 他泌尿器 官
62 3.33 3.32%	56 3.03 2.54%	130 6.86 2.37%	160 8.55 2.76%	246 16.50 2.71%	293 19.36 3.91%	288 38.92 3.19%	185 23.20 3.05%	475 60.09 2.80%	309 38.44 3.12%
(C44) 皮膚	(C11), (M- 959-976) ⁵ 鼻咽， 非何杰金 氏淋巴瘤 並列	(C67) 膀胱	(C22) 肝及肝內 膽管	(C61) 攝護腺	(C16) 胃	(C44) 皮膚	(C65-C66, C68) 腎盂及其他 泌尿器官	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏 淋巴瘤	(C25) 胰
54 2.90 2.89%	54 2.92 2.45%	108 5.70 1.97%	148 7.91 2.56%	223 14.96 2.45%	262 17.31 3.50%	231 31.21 2.56%	183 22.95 3.01%	406 51.36 2.39%	304 37.82 3.07%
(C15) 食道	(C11), (M- 959-976) ⁵ 鼻咽， 非何杰金 氏淋巴瘤 並列	(C44), (M- 980-998) ⁴ 皮膚， 白血病 並列	(C11) 鼻咽	(C44) 皮膚	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏 淋巴瘤	(M-959-976) ⁵ 非何杰金氏 淋巴瘤	(C25) 胰	(C67) 膀胱
49 2.63 2.62%	54 2.92 2.45%	98 5.17 1.79%	130 6.94 2.24%	216 14.49 2.38%	150 9.91 2.00%	203 27.43 2.25%	159 19.94 2.62%	387 48.96 2.28%	294 36.58 2.97%

4. 白血病：包括 ICD-O-3 M-98003 - M-99643、M-99803 - M-99893。

5. 非何杰金氏淋巴瘤：包括 ICD-O-3 M-959、M-967 - 972、M-975、M-97643；何杰金氏淋巴瘤：包括 ICD-O-3 M-965 - 966。

6. 口腔、口咽及下咽：包括 ICD-O-3 C00-C06、C09-C10、C12-C14。