

# 台灣癌症登記中心通知

急件

發件人： 台灣癌症登記中心  
電話： 02-2341-6012  
傳真： 02-2341-5967  
地址： 100 台北郵政 84-310 信箱  
日期： 102 年 3 月 1 日  
編號： 癌登 102002 號

收文者： 所有申報醫院

副本收文者： 行政院衛生署國民健康局、台灣癌症登記學會

主 題： 為因應 102 年癌症登記實務作業之需求，請 貴院依說明段辦理

急件       請檢閱       請加註       請回覆       請回收

- 一、 本案係依行政院衛生署國民健康局委託「台灣癌症登記工作計畫」辦理。
- 二、 自 **101 年新診斷癌症** 個案起(不溯及既往)，其癌症登記申報原則請依附件一規定辦理。
- 三、 即日起，若「身分證字號、癌症發生順序」此兩欄位異動，務必填寫異動單；原先病歷號碼或癌症部位異動，請直接進行線上異動，不需再填寫異動單。新修訂癌症資料異動表單已重新放置癌登中心網站"資料下載"處自行下載使用。
- 四、 因應上述第三點修正，本中心同步更新「100 年版台灣癌症登記摘錄手冊」-101 年修訂版第 15 頁申報個案條件內容。完整修訂版檔案請逕自台灣癌症登記中心網站 <http://tcr.cph.ntu.edu.tw/main.php?Page=A6> 下載。

台灣癌症登記中心  
Taiwan Cancer Registry

有關「子宮頸癌前病變」與「腸胃道 Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)」之申報規則，經台灣病理學會專家協助與指導國民健康局台灣癌症登記中心建議修訂如下：

(1) 子宮頸癌前病變申報規則：

Mcode	若癌登醫院病理報告描述為：	是否申報至癌登中心？
8077/2	Cervical intraepithelial neoplasia, grade III	是
8077/2	CIN III, NOS	是
8077/2	CIN III with severe dysplasia	是
-	CIN II	否
-	CIN I	否
<b>8077/2</b>	<b>Severe dysplasia (等同 CIN III)</b>	<b>是 (新增規則)</b>
-	Moderate dysplasia	否
-	Mild dysplasia	否
8077/2	HSIL, CIN III	是
-	HSIL, CIN II	否
-	LSIL	否

(2) Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) 惡性申報規則：

依據 WHO prognostic group 結合 AJCC 第七版來判定胃(Gastric)與胃除外(Non-gastric)之 GIST 惡性(Malignant)判定原則為 Gastric GIST 之 WHO group 為 1、2、3a、4 或 Non-gastric GIST 之 WHO group 為 1 時，視為良性腫瘤；其餘均視為惡性腫瘤並以 ICD-O-3 組織型態編碼 8936/3 申報。表格整理如下：

AJCC Stage	Tumor size	Mitotic rate (per 50 HPFs)	Prognostic group	Revised NIH Risk Joensuu, 2008	是否申報至癌登中心？
<b>Gastric GIST</b>					
Stage IA	≤2cm	Low (≤5)	1	Very low	否
Stage IA	>2 - ≤5cm	Low (≤5)	2	Low	否
Stage IB	>5 - ≤10cm	Low (≤5)	3a	Intermediate	否
Stage II	>10cm	Low (≤5)	3b	High	是
Stage II	≤2cm	High (>5)	4	Intermediate or High	否
Stage II	>2 - ≤5cm	High (>5)	5	Intermediate or High	是
Stage IIIA	>5 - ≤10cm	High (>5)	6a	High	是
Stage IIIB	>10cm	High (>5)	6b	High	是
<b>Non-gastric GIST</b>					
Stage I	≤2cm	Low (≤5)	1	Very low	否
Stage I	>2 - ≤5cm	Low (≤5)	2	Low	是
Stage II	>5 - ≤10cm	Low (≤5)	3a	High	是
Stage IIIA	>10cm	Low (≤5)	3b	High	是
Stage IIIA	≤2cm	High (>5)	4	Intermediate or High	是
Stage IIIB	>2 - ≤5cm	High (>5)	5	High	是
Stage IIIB	>5 - ≤10cm	High (>5)	6a	High	是
Stage IIIB	>10cm	High (>5)	6b	High	是

資料來源：Int J Clin Exp Pathol. 2010;3(5):461-471、WHO blue book 第四版第 74 頁與 AJCC 第七版第 177 頁。